




La méthamphétamine au Canada



Au pays, le taux d'usage est faible dans la population générale



Source : Statistique Canada. Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues, 2018

Le taux d'usage de méthamphétamine est faible au pays, mais l'usage et les méfaits sont en hausse dans certaines régions

↑ Décès dus à la meth



Meth détectée lors de décès par intoxication au fentanyl :

De 2015 à 2017 :

260 % en Alberta
240 % en Ontario

Pour en savoir plus sur ces hausses, voir le sommaire canadien sur la drogue (méthamphétamine) du CCDUS

↑ Demande pour des services de traitement et de réduction des méfaits



300 % en C.-B. (2012-2015)
500 % en Saskatchewan (2012-2015)
2400 % au Manitoba (2013-2018)
300 % en Ontario (2012-2017)

↑ Hospitalisations dues à des stimulants†



De 2010 à 2015 :
800 % en Alberta
600 % au Manitoba
500 % en C.-B.

↑ Indicateurs de justice pénale



330 % saisies de meth (2015-2016)
550 % accusations de possession (2010-2017)
300 % accusations de trafic (2010-2017)

†Principalement la meth mais aussi les autres amphétamines et les stimulants d'ordonnance

Que pouvons-nous faire pour contrer la hausse de l'usage et des méfaits de la méthamphétamine?



Chercheurs

Prioriser la surveillance et l'échange de connaissances sur l'usage de drogue et les méfaits



Responsables des politiques

Agir sur les déterminants de la santé liés à l'usage de meth et d'autres substances



Fournisseurs de services

Accroître la disponibilité des services de traitement et de réduction des méfaits