


TROUBLES LIÉS AUX SUBSTANCES UN GRAVE PROBLÈME DE SANTÉ

Rapport :


Répercussions des troubles liés aux substances sur l'utilisation des services hospitaliers




L'alcool était responsable de plus de la moitié (145 M\$) des 267 M\$ associés aux hospitalisations pour des TLS en 2011

54 %


des coûts hospitaliers sont liés à l'alcool




JOURS PASSÉS À L'HÔPITAL + COÛTS HOSPITALIERS EN HAUSSE POUR :



ET CE N'EST QUE LA POINTE DE L'ICEBERG...



Les répercussions des TLS sur l'utilisation des services hospitaliers SONT BEAUCOUP PLUS **GRANDES**



Les données présentées n'incluent que les personnes hospitalisées principalement pour un TLS, et non celles admises pour des méfaits associés à la consommation ni celles admises dans des services offerts dans la collectivité.

Que peut-on faire?

Les investissements dans la prévention, l'intervention précoce et le traitement pourraient réduire le nombre de visites à l'hôpital.

+

Les Canadiens devraient suivre les **Directives de consommation d'alcool à faible risque du Canada :**



Centre canadien de lutte contre les toxicomanies

Collaboration. Connaissance. Changement.

© Centre canadien de lutte contre les toxicomanies, 2014

Dans ces directives, un « verre » correspond à



Bière / cidre / cooler

341 ml (12 oz)
5 % d'alcool

Vin

142 ml (5 oz)
12 % d'alcool

Spiritueux

(ex. rye, gin ou rhum)
43 ml (1,5 oz)
40 % d'alcool