




La méthamphétamine au Canada



Au pays, le taux d'usage est faible dans la population générale



Source : Statistique Canada. Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues, 2018

Le taux d'usage de méthamphétamine est faible au pays, mais l'usage et les méfaits sont en hausse dans certaines régions

↑ Décès dus à la meth



Meth détectée lors de décès par surdose de drogue illicite :
360 % en C.-B. (2008-2017)
260 % en Alberta (2015-2017)
170 % au Manitoba (2016-2017)

↑ Demande pour des services de traitement et de réduction des méfaits



150 % en C.-B. (2015-2018)
300 % en Alberta (2011-2016)
500 % en Saskatchewan (2009-2016)
270 % au Manitoba (2014-2019)
390 % en Ontario (2012-2017)

↑ Hospitalisations dues à des stimulants[†]



De 2010 à 2015 :
800 % en Alberta
600 % au Manitoba
500 % en C.-B.

↑ Indicateurs de justice pénale



190 % saisies de meth (2015-2017)
630 % accusations de possession (2010-2018)
340 % accusations de trafic (2010-2018)

[†]Principalement la meth mais aussi les autres amphétamines et les stimulants d'ordonnance

Que pouvons-nous faire pour contrer la hausse de l'usage et des méfaits de la méthamphétamine?



Chercheurs

Prioriser la surveillance et l'échange de connaissances sur l'usage de drogue et les méfaits



Responsables des politiques

Agir sur les déterminants de la santé liés à l'usage de meth et d'autres substances



Fournisseurs de services

Accroître la disponibilité des services de traitement et de réduction des méfaits



Consommateurs de drogue

Éviter de consommer seul et consommer dans un endroit sûr, avec du matériel sécuritaire, pour réduire les risques